

Blodsirkulasjon i bena

Solvenix®



Likeverdig
effekt som
støttestrømper
etter 12 uker

- ✓ Reduserer hevelse (ødem) i føtter og ben
- ✓ Lindrer smerte- og tyngdefølelse
- ✓ Klinisk bevist effekt

SO2605GJ

Solvenix®

- behandler dålig blodsirkulasjon i bena



Kan brukes med eller uten støttestrømper

BRUK

- Ved dålig blodsirkulasjon i bena (venøs insuffisiens) som ofte fører til åreknuter
- Lindre symptomer som hevelser, smerter, tygdefølelse, kløe, spenninger og kramper
- Daglig bruk gir likeverdig effekt som støttestrømper etter 12 uker

HVORDAN BRUKE

1 depotkapsel 2 ganger daglig

Påvist effekt etter 4 uker,
optimal effekt etter 12 uker

- Langtidsbruk er mulig i samråd med lege
- Kan brukes med eller uten støttestrømper
- Alternativ till støttestrømper under perioder som vår/sommer

GODE RÅD

- Har lege ordinert kompresjonsstrømper bør man kun slutte i samråd med legen

IKKE TIL BRUK

- Når hovne i ben har annen årsak enn dårlig blodsirkulasjon i beina.
- Ikke for gravide eller ammende



Solvenix® harde depotkapsler. Farmakoterapeutisk gruppe: Vasoprotektor. Reseptfritt. ATC kode: C05CX03 Hver depotkapsel inneholder 240 – 290 mg ekstrakt (som tørret ekstrakt) av *Aesculus hippocastanum* L., semen (tilsvarende 1,08 – 1,60 g hestekastanje) som svarer til 50 mg triterpenglykosider beregnet som aescin. Ekstraksjonsløsning: Etanol 50 % (V/V). **Indikasjon:** Plantebasert legemiddel til behandling av kronisk venøs insuffisiens (KVI), som er forbundet med åreknuter, ødem i bena, tyngdefølelse, smerter, tretthet, kløe, spenningsfølelse og kramper i leggene. **Dosering:** Voksne og eldre: 1 depotkapsel 2 ganger daglig. Kapslene svelges hele sammen med væske. Hvis det oppstår mage-tarm symptomer, anbefales det å ta kapslene sammen med måltid. Solvenix er ikke beregnet til barn og ungdom under 18 år. Behandlingsvarighet: Minst 4 ukers behandling kan være nødvendig før man ser effekt. Langtidsbruk er mulig i samråd med lege. **Kontraindikasjoner:** Overfølsomhet overfor innholdsstoffene. **Advarsler og forsiktighetsregler:** Lege bør kontaktes hvis forverring av symptomene skulle inntreffe etter at behandlingen er påbegynt eller hvis ikke symptomene bedres innen seks uker, da ødem kan ha andre årsaker. Hvis hudinflammasjoner, tromboflebitt, subkutan indurasjon, sterke smerter, sår, plutselig hevelse i et ben eller begge bena, hjerte- eller nyreinsuffisiens skulle oppstå, bør en lege kontaktes. Pasienter som har kompresjonsbehandling (støttestrømpe) i henhold til tidligere ordinasjon bør ikke avslutte kompresjonsbehandlingen uten etter samråd med lege. **Graviditet og amming:** Anbefales ikke til gravide og ammende da det ikke foreligger tilstrekkelig data. **Bivirkninger:** Tilfeller av kløe, allergiske reaksjoner, hodepine, vertigo og gastrointestinale plager har vært rapportert. Frekvensen er ukjent. **Pakningsstørrelse:** 60 kapsler. **For mer informasjon:** Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.no eller www.Felleskatalogen.no. Basert på SPC: 22.10.2024