

Solvenix[®] – Mot hovne og tunge bein

Reseptfritt plantebasert legemiddel til behandling av kronisk venøs insuffisiens (KVI), som er forbundet med åreknuter, ødem i beina, tyngdefølelse, smerter, tretthet, kløe, spenningsfølelse og kramper i leggene.



Solvenix behandler symptomer ved påvist KVI

- ✓ Reduserer ødem
- ✓ Lindrer smerte
- ✓ Letter tyngdefølelsen

*Dosering: 1 depotkapsel 2 ganger daglig, minimum 4 uker.

Solvenix[®] – Mot hovne og tunge bein



◀ Les mer om Solvenix

Målgruppe: For voksne over 18 år med påvist kronisk venøs insuffisiens (KVI).

Kundefordel:

- Reseptfritt legemiddel som behandler symptomer på KVI
- Klinisk dokumentert effekt
- Virkestoffet hestekastanjeekstrakt (*Aesculus hippocastanum* L.)
- reduserer symptomer på KVI, så som ødem, smerte, tyngdefølelse og kløe
- Tilsvarende effekt som støttestrømper på ødem¹
- Enkel dosering

Dosering: 1 depotkapsel 2 ganger daglig, minimum 4 uker.

Beskrivelse: Harde kapsler med hvit underdel og rosa overdel. Svelges hel sammen med væske.

Husk: Brukes etter at KVI er diagnostisert av lege. Må ikke brukes ved allergi mot hestekastanjeekstrakt eller noen av de øvrige innholdsstoffene. Minst 4 ukers behandling kan være nødvendig før man ser effekt. Langtidsbruk er mulig i samråd med lege.

Graviditet/amming: Nei.

Kan brukes: Alene eller sammen med støttestrømper, følg legens eventuelle råd. Vær oppmerksom på at pasient kun bør avslutte bruk av støttestrømper i samråd med lege.

Referanse: 1) Solvenix preparatomtale (2022-05-31) https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/09-6835.pdf

Solvenix® harde depotkapsler. *Aesculus hippocastanum* L. Reseptfritt. ATC kode: C05CX03. 1 kapsel inneholder ekstrakt av hestekastanje som svarer til 50 mg triterpenglykosider beregnet som aescin. Plantebasert legemiddel til behandling av kronisk venøs insuffisiens, som er forbundet med åreknuter, ødem i beina, tyngdefølelse, smerter, tretthet, kløe, spenningsfølelse og kramper i leggene. Fra 18 år. Dosering: 1 depotkapsel 2 ganger daglig. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor innholdsstoffene. Hvis hudinflamasjoner, tromboflebitt, subkutan indurasjon, sterke smerter, sår, plutselig hevelse i et ben eller begge beina, hjerte- eller nyreinsuffisiens skulle oppstå, bør en lege kontaktes. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Bivirkninger: Tilfeller av kløe, allergiske reaksjoner, hodepine, vertigo og gastrointestinale plager har vært rapportert. Pakningsstørrelse: 60 kapsler. For mer informasjon: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.no eller www.Felleskatalogen.no. Basert på SPC: 24.08.2021